**提出用**

# 黒大豆枝豆栽培履歴（黒豆の枝豆街道マップ2024用）

※8月30日までにご提出ください。

※ 黒豆の枝豆の直売所の情報を提出いただくのに際し、適性に栽培がされていることを確認するために栽培履歴を提出いただくものです。栽培履歴の内容は公開しません。

住　所
氏　名　　印
面　積　　a

| ① 栽培の履歴 | | | ② 元肥の使用状況 | | | | ③ 追肥の使用状況 | | | | ④ 出荷販売先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| は　種 | 月 | 日 | 元肥 | 月 | 日 | kg | 追肥 | 月 | 日 | kg | 直売 |
| 移　植 | 月 | 日 | | 月 | 日 | kg | | 月 | 日 | kg | 朝市 |
| 中耕・培土 | 月 | 日 | | 月 | 日 | kg | | 月 | 日 | kg | その他（　　） |
| 収穫始 | 月 | 日 | | 月 | 日 | kg | | 月 | 日 | kg | ※該当するものに○ |
| 収穫終 | 月 | 日 | 10a/kg | 月 | 日 | kg | 10a/kg | 月 | 日 | kg | |

⑤農薬の使用状況

| 種別 | 農薬名 | 農薬使用基準 | | 農薬使用実績 | | | | | ※参考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 希釈倍率 | 使用時期 | 月/日 | 月/日 | 月/日 | 月/日 | 月/日 | | |
| | | 使用量 | 使用回数 | | | | | | 対象病害虫 | 備考 |
| 病他 | キヒゲンR-2フロアブル | 1kg当たり原液 20ml | は種前 1回 | | | | | | 紫斑病・苗立枯病・タネバエ・カラス・ハト | 塗沫処理 |
| 病他 | クルーザーMAXX | 1kg当たり原液 8ml | は種前 1回 | | | | | | アブラムシ類・タネバエ・ネキリムシ類・フタスジヒメハムシ・茎疫病・リゾクトニア根腐病・苗立枯病（ピシウム菌）・紫斑病・黒根腐病 | 塗沫処理 |
| 虫 | カルホス微粒剤F | 6kg/10a | は種時又は定植時 1回 | | | | | | タネバエ・ネキリムシ類 | 土壌表面散布　土壌混和処理 |
| 虫 | ダイアジノン粒剤5 | 4～6kg/10a | 収穫30日前まで 4回以内 | | | | | | マメシンクイガ・カメムシ類・シロイチモジマダラメイガ・ダイズサヤタマバエ・フタスジヒメハムシ | 散布 |
| 虫 | アグロスリン乳剤 | 2000倍 100～300L/10a | 収穫7日前まで 3回以内 | | | | | | カメムシ類・フタスジヒメハムシ・マメシンクイガ | 散布 |
| 虫 | トレボン乳剤 | 1000倍 100～300L/10a | 収穫14日前まで 2回以内 | | | | | | カメムシ類・フタスジヒメハムシ・ハスモンヨトウ・マメシンクイガ・ダイズサヤタマバエ・・ウコンノメイガ | 散布 |
| 虫 | プレバソンフロアブル5 | 4000倍 100～300L/10a | 収穫3日前まで 3回以内 | | | | | | ウコンノメイガ・マメシンクイガ・ハスモンヨトウ | 散布 |
| 虫 | ダニトロンフロアブル | 1000～2000倍 150～300L/10a | 収穫7日前まで 1回 | | | | | | ハダニ類 | 散布 |
| | | | | | | | | | | |

| 種別 | 農薬名 | 農薬使用基準 | | 農薬使用実績 | | | | | ※参考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 薬量 | 使用時期 | 月/日 | 月/日 | 月/日 | 月/日 | 月/日 | | |
| | | 希釈水量 | 使用回数 | | | | | | 対象病害虫 | 備考 |
| 除草 | バスタ液剤 | 300～500ml/10a | は種前・は種後出芽前・定植5日前まで（雑草生育期） | | | | | | 一年生雑草 | 雑草茎葉散布 |
| | | | 収穫28日前まで（株間処理：本葉5葉期以降雑草生育期） | | | | | | | |
| | | 100～150L/10a | 収穫28日前まで（畦間処理：雑草生育期） | | | | | | | |
| | | | 3回以内 | | | | | | | |
| 除草 | ポルトフロアブル | 200～300ml /10a | 雑草生育期「イネ科雑草の3～10葉期但し、収穫30日前まで | | | | | | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草茎葉散布 |
| | | 100L/10a | 1回 | | | | | | | |
| 除草 | ラウンドアップマックスロード | 200～500ml/10a | 耕起前又は出芽前まで | | | | | | 一年生雑草 | 雑草茎葉散布 |
| | | 50～100L/10a | 3回以内 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |